Vacuna del VPH para preadolescentes y adolescentes

¿Qué es la enfermedad del VPH?

VPH significa Virus del Papiloma Humano, un virus común. En los Estados Unidos, cerca de 17,000 mujeres y 9,000 hombres son afectados anualmente por un cáncer relacionado con el VPH. Muchos de estos cánceres se pueden prevenir a través de la vacunación.

¿Por qué necesita mi hijo(a) la vacuna del VPH?

Esta vacuna protege contra la mayoría de los cánceres causados por una infección de VPH. El VPH es un virus muy común que se transmite de una persona a otra cuando tienen contacto sexual entre sí. Cada año, cerca de 14 millones de personas, incluido los adolescentes, se infectan con el VPH. El VPH puede causar cáncer cervical en las mujeres y cáncer del pene en los hombres. El VPH También puede causar cáncer del ano, cáncer de la garganta y verrugas genitales tanto en los hombres como en las mujeres.

¿Cuándo debe ser vacunado(a) mi hijo(a)?

Se recomienda la vacuna del VPH para niños y niñas preadolescentes de 11 a 12 años de edad, para que estén protegidos mucho antes de ser expuestos al virus. Si su hijo(a) adolescente aún no ha recibido la vacuna, hable con su doctor para que se la ponga lo más pronto posible. La vacuna del VPH se administra en 3 inyecciones. La segunda inyección se pone 1 ó 2 meses después de la primera y la tercera inyección se pone 6 meses después de la primera. Asegúrese de que su hijo(a) reciba las 3 dosis para que esté completamente protegido(a).

Si hay un retraso en una dosis de la vacuna del VPH, ¿debo empezar toda la serie de nuevo?

No, no empiece de nuevo la serie. Continúe donde se quedó y complete el resto de la serie.

¿Es segura la vacuna del VPH?

Sí. Las vacunas del VPH han sido estudiadas en decenas de miles de personas en todo el mundo. Más de 57 millones de dosis han sido administradas y son raros los casos en que se han producido efectos secundarios graves. La seguridad de las vacunas sigue siendo controlada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Los efectos secundarios más comunes que han sido reportados son leves. Estos incluyen: dolor en el área del brazo donde fue aplicada la inyección, mareos, fiebre y nauseas. Algunos preadolescentes y adolescentes pueden desmayarse después de recibir la vacuna del VPH o cualquier otra inyección. Asegúrese de que su hija(o) coma algo antes vacunarse. Los preadolescentes y adolescentes deben estar sentados o acostados cuando se les ponga la vacuna y deben permanecer en esa posición por 15 minutos después de ser inyectados, para prevenir un desmayo y cualquier lesión que pudiera producirse a causa del mismo.

¿Cómo puedo obtener ayuda para pagar estas vacunas

El programa de Vacunas para Niños (VFC, por sus siglas en inglés) provee vacunas a menores de 18 años de edad o menores que no tienen seguro médico o tienen un seguro incompleto, son elegibles para Medicaid o son Indio-americanos o nativos de Alaska.

Where can my child get vaccinated?

Su hijo(a) puede visitar a su doctor o proveedor de atención médica para que le ponga la vacuna del VPH. Los Departamentos de Salud locales también ofrecen la vacuna del VPH. Para encontrar un Departamento de Salud cerca de usted, vaya a: dph.georgia.gov/public-health-districts

Para obtener más información acerca de las vacunas del VPH y otras vacunas para preadolescentes y adolescentes, hable con el proveedor de atención médica de su hijo(a). También puede encontrar información en el sitio web de la Oficina de Inmunización del Departamento de Salud Pública de Georgia dph.georgia.gov/immunization-section o en el sitio web del CDC www.cdc.gov/vaccines/who/teens/index.html

DPH Georgia Department of Public Health

¿Tiene preguntas?

Hable con su proveedor de atención médica.

http://dph.georgia.gov/immunization-section