

7th Grade Vaccination Requirements

What is the pertussis booster requirement?

All students born on or after January 1, 2002 and entering or transferring into 7th grade need proof of an adolescent pertussis (whooping cough) booster immunization (called "Tdap"). Proof of Tdap immunization must be documented on the Georgia immunization certificate (Form 3231).

What is Tdap and what are the diseases that the Tdap vaccine prevents?

Tdap is a booster vaccine for older children, adolescents, and adults. It safely protects against 3 dangerous diseases: tetanus, diphtheria, and pertussis (also called whooping cough).

- Pertussis – also known as whooping cough is a contagious disease that causes violent coughing fits that make it hard to breathe. It spreads easily when someone with the disease coughs or sneezes. The cough can last for months. Pertussis is particularly dangerous for young babies.
- Tetanus – causes a severe, painful tightening (spasms) of muscles, including of the jaw ('lockjaw'), which can limit swallowing and breathing.
- Diphtheria – is a throat infection that can lead to breathing problems, paralysis, heart failure and death.

Do ALL 7th grade students need to get the pertussis immunization (Tdap)?

Yes. Unless they have an exemption, all students born on or after January 1, 2002 and entering 7th grade must have proof having received the Tdap booster shot. This includes current and new students in both public and private schools. Students who have already received the Tdap vaccine will need to show proof with a new Georgia immunization certificate (Form 3231), so check with your doctor or health care provider.

Why does my child need Tdap?

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommends Tdap for preteens at ages 11 or 12 years for protection against tetanus, diphtheria and pertussis (whooping cough). Protection provided by the DTaP vaccine received in childhood wears off as kids get older, so preteens and teens need a booster shot known as Tdap. Getting this booster not only protects preteens and teens, but also the people around them.

When should my child get vaccinated with Tdap?

The Centers for Disease Control (CDC) recommends Tdap booster immunization for:

- Adolescents age 11-12 years
- Adolescents age 13-19 years, who have not yet received it

What if my child had whooping cough recently or in the past?

Any protection (immunity) developed after having pertussis disease wears off, leaving your child at risk for getting pertussis again. A pertussis booster shot is needed to protect your child in the future and to meet the school requirement.

Instead of getting a Tdap booster to meet the requirement, can my child get a blood test to check for protection (immunity) against pertussis?

No. Testing for immunity to pertussis is not reliable and will not meet the school requirement.

What if my child does not have proof of a Tdap shot before school starts?

Your child may not be able to attend school until you submit the documentation for the Tdap requirement to the school.

How long do you have to wait after your last tetanus shot (Td) before getting Tdap?

According to the CDC recommendations, the dose of Tdap required for the school law may be given at any time after the last tetanus shot.

Where can my child get vaccinated?

Your child can visit their doctor or health care provider to get their Tdap shot. Local Health Departments also offer the Tdap vaccine. To find a Health Department near you visit:

<http://dph.georgia.gov/public-health-districts>.

Are there other vaccines recommended for adolescents and teens? Yes, CDC recommends a seasonal influenza (flu) vaccination to protect teens from the flu, and HPV vaccination to protect them from most of the cancers caused by human papillomavirus (HPV) infection. Although not required for school attendance in Georgia, they are strongly recommended. They can be given at the same time as other vaccines.

Where can I go for more information? For more information, visit the Georgia Department of Public Health, Immunization Office website at <http://dph.georgia.gov/immunization-section> or CDC's website at <http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pertussis/>.



Have questions?

Talk with your Healthcare Provider.

<http://dph.georgia.gov/immunization-section>

7th Grade Vaccination Requirements



What is the meningococcal disease (meningitis) vaccination requirement?

All students born on or after January 1, 2002 and entering or transferring into 7th grade need proof of an adolescent meningococcal (meningitis) vaccination. Proof of meningitis vaccination must be documented on the Georgia immunization certificate (Form 3231).

What is meningococcal disease?

Meningococcal disease is a serious bacterial illness. It is a leading cause of bacterial meningitis in children 2 through 18 years old in the United States. Meningitis is an infection of the covering of the brain and the spinal cord. High fever, headache, vomiting, stiff neck and a rash are symptoms of meningococcal disease. Meningitis can cause shock, coma, and death within hours of the first symptoms. Among people who develop meningitis, 10 to 15 percent die, in spite of treatment with antibiotics. Of those who live, permanent brain damage, hearing loss, kidney failure, loss of arms or legs, or chronic nervous system problems can occur. This is why preventing the disease through use of meningococcal vaccination is important.

Do ALL 7th grade students need to get the meningitis vaccination?

Yes. Unless they have an exemption, all entering 7th grade must have proof of having received a meningococcal vaccination. This includes current and new students in both public and private schools. Students who have already received the meningococcal vaccine will need to show proof with a new Georgia immunization certificate (Form 3231), so check with your doctor or health care provider.

Why does my child need the meningitis vaccine?

Vaccination is one of the most effective ways to prevent most meningococcal diseases and this requirement will help protect your child. Seventy-six percent of meningococcal cases among 11-19 year olds are vaccine preventable. In addition to it being a requirement for school, children who get a meningococcal shot will be better protected during their school years.

When should my child get vaccinated with the meningococcal vaccine?

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommends that children age 11 - 12 years be routinely vaccinated with a meningococcal vaccination and receive a booster dose at age 16 years.

What if my child had meningitis recently or in the past?

A meningococcal vaccination is needed to both protect your child in the future and to meet the school requirement.

Instead of getting a meningococcal shot to meet the requirement, can my child get a blood test to check for protection (immunity) against meningococcal disease?

No. Testing for immunity to meningococcal disease is not reliable and will not meet the school requirement.

What if my child does not have proof of a meningococcal shot before school starts?

Your child may not be able to attend school until you submit the documentation (Form 3231) for the meningococcal vaccination requirement to the school.

Where can my child get vaccinated?

Your child can visit their doctor or health care provider to get their meningococcal shot. Local Health Departments also offer the meningococcal vaccine. To find a Health Department near you visit: <http://dph.georgia.gov/public-health-districts>.

Are there other vaccines recommended for adolescents and teens? Yes, CDC recommends a seasonal influenza (flu) vaccination to protect teens from the flu, and HPV vaccination to protect them from most of the cancers caused by human papillomavirus (HPV) infection. Although not required for school attendance in Georgia, they are strongly recommended. They can be given at the same time as other vaccines.

Where can I go for more information? For more information, visit the Georgia Department of Public Health, Immunization Office website at <http://dph.georgia.gov/immunization-section> or CDC's website at <http://www.cdc.gov/meningococcal/vaccine-info.html>



Have questions?

Talk with your Healthcare Provider.

<http://dph.georgia.gov/immunization-section>

Requisitos de vacunación para el 7.º grado

¿Qué es el requisito de refuerzo de vacuna contra la tosferina?

Todos los estudiantes nacidos a partir del 1 de enero de 2002 que estén ingresando o transfiriéndose al 7.º grado necesitan presentar prueba de que han recibido la vacuna de refuerzo contra la tosferina ("Tdap") en adolescentes. La prueba de que han recibido la vacuna Tdap debe mostrarse en el certificado de vacunación de Georgia (formulario 3231).

¿Qué es la vacuna Tdap y qué enfermedades previene?

La Tdap es una vacuna de refuerzo para niños mayores, adolescentes y adultos que protege de forma segura contra 3 enfermedades peligrosas: tétanos, difteria y tosferina.

- La tosferina es una enfermedad contagiosa que provoca violentos ataques de tos que pueden impedir la respiración. Se propaga fácilmente cuando alguien que está enfermo tose o estornuda. La tos puede durar meses. La tosferina es especialmente peligrosa para los bebés.
- El tétanos provoca una grave y dolorosa contracción (espasmo) de los músculos, incluyendo los de la mandíbula (trismo), lo que puede dificultar tragar y respirar.
- La difteria es una infección de la garganta que puede provocar problemas para respirar, parálisis, insuficiencia cardíaca y la muerte.

¿Es necesario que TODOS los alumnos del 7.º grado reciban la vacuna contra la tosferina (Tdap)?

Sí. A menos que tengan una exención, todos los estudiantes nacidos a partir del 1 de enero de 2002 que ingresen al 7.º grado deben presentar prueba de haber recibido la vacuna de refuerzo Tdap. Esto incluye alumnos nuevos y existentes en las escuelas públicas y privadas. Los estudiantes que ya hayan recibido la vacuna Tdap tendrán que mostrar como comprobante el nuevo certificado de vacunación de Georgia (formulario 3231). Verifique si lo tiene su médico o proveedor de atención médica.

¿Por qué necesita mi hijo la vacuna Tdap?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan la vacuna Tdap para proteger a los preadolescentes de 11 a 12 años de edad contra el tétanos, la difteria y la tosferina. La protección que brinda la vacuna DTaP en la infancia disminuye a medida que los niños crecen, por lo que los preadolescentes y adolescentes necesitan la vacuna de refuerzo conocida como Tdap. Este refuerzo no solo los protege a ellos, sino también a las personas que los rodean.

¿Cuándo debe recibir mi hijo la vacuna Tdap?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan la vacuna Tdap de refuerzo para:

- Preadolescentes de 11 a 12 años de edad
- Adolescentes de 13 a 19 años que aún no la hayan recibido.

¿Qué hago si mi hijo tuvo tosferina recientemente o en el pasado?

Toda la protección (inmunidad) que se desarrolla después de haber tenido tosferina disminuye con el tiempo, dejando al niño a riesgo de contraer nuevamente la enfermedad. La vacuna de refuerzo contra la tosferina es necesaria para proteger a su hijo en el futuro y para cumplir con el requisito escolar.

En lugar de ponerle a mi hijo la vacuna Tdap para cumplir con el requisito, ¿puedo hacerle una prueba de sangre para ver si tiene inmunidad contra la tosferina?

No. Las pruebas de inmunidad contra la tosferina no son confiables y no cumplen con el requisito escolar.

¿Qué pasa si mi hijo no tiene comprobante de la vacuna Tdap antes de que empiecen las clases?

Puede que su hijo no sea admitido en la escuela mientras no presente el comprobante de la vacuna Tdap.

¿Cuánto tiempo hay que esperar después de la última vacuna contra el tétanos (Td) para vacunarlo con la Tdap?

Según las recomendaciones de CDC, la dosis de Tdap para el requisito escolar puede darse en cualquier momento después de la última vacuna contra el tétanos.

¿Dónde puedo llevar a mi hijo a vacunarse?

Puede llevarlo a su médico o proveedor de atención médica. Los Departamentos de Salud locales también ofrecen la Tdap. Para encontrar un Departamento de Salud cerca de usted visite: <http://dph.georgia.gov/public-health-districts>.

¿Hay otras vacunas recomendadas para los preadolescentes y adolescentes? Sí, los CDC recomiendan la vacuna contra la influenza estacional para protegerlos contra la gripe, así como la vacuna contra el VPH (virus del papiloma humano) para protegerlos de la mayoría de los cánceres causados por la infección que provoca este virus. Aunque no son requisito para la asistencia a las escuelas en el estado de Georgia, se recomiendan encarecidamente. Se pueden dar al mismo tiempo que otras vacunas.

¿Dónde puedo obtener más información? Visite el sitio web sobre inmunización del Departamento de Salud Pública de Georgia en <http://dph.georgia.gov/immunization-section> o el sitio web de los CDC en <http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pertussis/>.



¿Tiene preguntas?

Hable con su proveedor de atención médica.

<http://dph.georgia.gov/immunization-section>

Requisitos de vacunación para el 7.º grado

¿Qué es el requisito de vacunación contra la enfermedad meningocócica (meningitis)?

Todos los estudiantes nacidos a partir del 1 de enero de 2002 que estén ingresando o transfiriéndose al 7.º grado necesitan presentar prueba de que han recibido en la adolescencia la vacuna contra la enfermedad meningocócica (meningitis). La prueba de que han recibido la vacuna contra la meningitis debe mostrarse en el certificado de vacunación de Georgia (formulario 3231).

¿Qué es la enfermedad meningocócica?

La enfermedad meningocócica es una enfermedad bacteriana grave. Es la causa principal de meningitis bacteriana en niños de 2 a 18 años de edad en los Estados Unidos. La meningitis es una infección de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Los síntomas de la enfermedad meningocócica pueden incluir fiebre alta, dolor de cabeza, vómitos, rigidez en el cuello y erupción en la piel. La meningitis puede causar shock, coma y muerte a las pocas horas de los primeros síntomas. Del 10 al 15 por ciento de las personas que contraen meningitis fallecen, a pesar del tratamiento con antibióticos. Las que sobreviven pueden sufrir daño cerebral permanente, pérdida de la audición, insuficiencia renal, pérdida de brazos o piernas, o problemas crónicos del sistema nervioso. Por eso es importante prevenir la enfermedad con la vacuna antimeningocócica.

¿Es necesario que TODOS los alumnos del 7.º grado reciban la vacuna contra la meningitis?

Sí. A menos que tengan una exención, todos los estudiantes que ingresen al 7.º grado deben tener comprobante de haber recibido una vacuna antimeningocócica. Esto incluye alumnos nuevos y existentes en las escuelas públicas y privadas. Los estudiantes que ya han recibido la vacuna antimeningocócica tendrán que mostrar como comprobante el nuevo certificado de vacunación de Georgia (formulario 3231). Verifique si lo tiene su médico o proveedor de atención médica.

¿Por qué necesita mi hijo la vacuna contra la meningitis?

La vacunación es una de las formas más efectivas de prevenir la mayoría de las enfermedades meningocócicas y este requisito contribuirá a la protección de su hijo. El 66% de los casos de enfermedad meningocócica en niños de 11 a 19 años de edad son prevenibles con la vacuna. Además de ser un requisito para la escuela, la vacuna antimeningocócica constituirá una mejor protección para su hijo durante los años escolares.

¿Cuándo debe recibir mi hijo la vacuna antimeningocócica?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que los niños de 11 a 12 años reciban la vacuna antimeningocócica de rutina y una dosis de refuerzo a los 16 años.

¿Qué hago si mi hijo tuvo meningitis recientemente o en el pasado?

La vacuna antimeningocócica es necesaria tanto para proteger a su hijo en el futuro como para cumplir con el requisito escolar.

En lugar de ponerle a mi hijo la vacuna antimeningocócica para cumplir con el requisito, ¿puedo hacerle una prueba de sangre para ver si tiene inmunidad contra la enfermedad meningocócica?

No. Las pruebas de inmunidad contra la enfermedad meningocócica no son confiables y no cumplen con el requisito escolar.

¿Qué pasa si mi hijo no tiene comprobante de la vacuna antimeningocócica antes de que empiecen las clases?

Puede que su hijo no sea admitido en la escuela mientras no presente el comprobante (formulario 3231) de la vacuna antimeningocócica.

¿Dónde puedo llevar a mi hijo a vacunarse?

Puede llevar a su niño al médico o a un proveedor de atención médica para que le ponga la vacuna antimeningocócica. Los Departamentos de Salud locales también ofrecen la vacuna antimeningocócica. Para encontrar un Departamento de Salud cerca de usted visite: <http://dph.georgia.gov/public-health-districts>.

¿Hay otras vacunas recomendadas para los preadolescentes y adolescentes? Sí, los CDC recomiendan la vacuna contra la influenza estacional para protegerlos contra la gripe, así como la vacuna contra el VPH (virus del papiloma humano) para protegerlos de la mayoría de los cánceres causados por la infección que provoca este virus. Aunque no son requisito para la asistencia a la escuela en el estado de Georgia, se recomiendan encarecidamente. Se pueden dar al mismo tiempo que otras vacunas.

¿Dónde puedo obtener más información? Para obtener más información, visite el sitio web sobre inmunización del Departamento de Salud Pública de Georgia en <http://dph.georgia.gov/immunization-section> (en inglés) o el sitio web de los CDC en <http://www.cdc.gov/meningococcal/vaccine-info.html>