

La tos ferina:



¿Qué es la tos ferina?

- una infección que se transmite fácilmente cuando alguien con la enfermedad tose o estornuda
- puede ser mortal para los bebés

Signos y síntomas de la tos ferina

Primeros síntomas

Usualmente los primeros síntomas son leves y parecidos a un resfriado común:

- moqueo nasal
- fiebre baja o nada de fiebre
- estornudos
- tos leve

Síntomas después de 1-2 semanas

Los síntomas pueden empeorar rápidamente y durar varios meses. Pueden incluir ataques de tos fuertes que causan:

- un sonido agudo
- vómitos
- problemas al respirar
- problemas para dormir
- cansancio extremo

Los síntomas en los bebés son diferentes

Usualmente los bebés menores de 6 meses de edad que sufren de tos ferina no tienen una tos típica. En las primeras etapas, los bebés pueden:

- sufrir jadeos o arcadas
- perder el apetito
- sufrir coloración azulada alrededor de la boca
- parar de respirar

Los síntomas pueden empeorar rápidamente. A veces los bebés necesitan ir al hospital para recibir cuidado médico.

Trate la tos ferina temprano

Llame al médico si usted o un miembro de su familia:

- muestra síntomas de tos ferina

Es posible que su médico le recete antibióticos

El tratamiento temprano con antibióticos puede:

- prevenir que empeore la enfermedad
- prevenir que no contagie la enfermedad a otras personas
- ser administrado a bebés y a otros miembros del hogar para prevenir que se enfermen

Si sufre de tos ferina:

- quédese en casa y evite el contacto con otras personas hasta que termine el tratamiento
- pida a un adulto que no esté enfermo que cuide a su bebé
- llame al médico de su bebé

Las vacunas contra la tos ferina previenen la enfermedad

Todos necesitan estar al día con las vacunas contra la tos ferina (DTaP para niños de 6 años de edad o menos o Tdap para niños mayores de 7 años).

Protéjense. Protejan a su familia.

¡Vacúnense!



¿Tiene preguntas?

Hable con su médico.

<http://health.state.ga.us/pertussis>