

乙胺丁醇

可能出现的副作用：

- 恶心、呕吐
- 手脚麻木、刺痛感

请报告：

- 如果您有肝脏或肾脏疾病史

请立即通知护士：

- 如果出现视力变化、辨认颜色时发生困难。

吡嗪酰胺

可能出现的副作用：

- 恶心、呕吐
- 皮疹、黄疸
- 关节肿痛
- 发热
- 食欲不振

请报告：

- 如果您有痛风史。
- 如果您有糖尿病史（高血糖）
- 如果您是孕妇。

指导：

- 每日至少饮用 8 杯（2 升）水

利福平

可能出现的副作用：

- 胃烧灼感、恶心、呕吐、腹泻
- 皮疹、出汗、皮肤发黄
- 黑尿、大便色浅
- 流泪
- 嗜睡
- 发热
- 口舌疼痛

请报告：

- 如果您要服用防治哮喘、突发症，艾滋病或糖尿病的药物。
- 如果您要服用防治心脏疾病或高血压的药物。
- 如果您要服用血液稀释药物（杜邦可密定）。
- 如果您要服用节育药片、使用 Norplant 或甲羟孕酮避孕针。
- 如果您要使用雌激素进行激素替代治疗。

说明：

- 体液（泪液、汗液、尿液）将变为桔黄色
- 不要带隐形眼镜，因为它们会污染眼部。
- 您的皮肤可能会对阳光更敏感，请使用防晒品。
- 某些节育措施可能会失效，请使用备用措施（例如避孕套）。

异烟肼

可能出现的副作用：

- 恶心、呕吐、便秘
- 手脚麻木、刺痛感、疼痛
- 视力变化、眼睛发黄
- 皮疹、皮肤发黄
- 食欲不振
- 黑尿（茶色/可口可乐色）
- 发热或恶寒

请报告：

- 如果您因为病情突然发作而服用药物。
- 如果您有突发病史。

说明：

- 服用本药物时最好能戒酒（啤酒、葡萄酒和威士忌）。
- 服用与药物一起得到的维生素 B-6。
- 如果发生面部潮红，应避免食用此类食品：老化的奶酪和肉类、酱油、包括豆酱在内的大豆制品、日本酱汁、意大利四季豆（蚕豆）、豌豆或蚕豆角、德国泡菜、朝鲜泡菜、浓缩酵母提取物（酵母调味品）、葡萄酒、啤酒（包括无酒精啤酒）。

请立即通知护士：

- 如果您出于任何原因停止服用这些药物。
- 如果您服用这些药物时发生任何副作用。

健康部门：

电话 _____

I have received a copy of this form and have had all my questions answered.

Patient's Signature